

Revista Cubana de Urología

ONCOLOGÍA UROLÓGICA

Detección del cáncer prostático en la comunidad del Policlínico Docente Wilfredo Santana.

Autores: Lázaro Deinys Rodríguez Borrego; Magdelin Navarro Cutiño; Juan Pablo Gurri Fuentes.

Hospital General Calixto García. La Habana, Cuba

Correo: deinysrb@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: El cáncer prostático es uno de los principales problemas de salud de la población masculina en el mundo, se diagnóstica un número mayor gradual de casos y en etapa cada vez más avanzada. **Objetivo:** Determinar el comportamiento de la detección del cáncer de próstata en la comunidad. **Método:** Estudio descriptivo de corte transversal en un universo de 990 pacientes y de ellos 98 conformaron la muestra. **Resultados:** predominaron las edades ≥ 75 años, (43,5 %), de la piel negra 51,9 %, con antecedentes familiares de cáncer prostático el 17,6 % y de ellos 11 (57,9 %) fueron de primera línea. El principal motivo de consulta fue el dolor óseo 41,7 %; el 54,7 % de los pacientes no presentaron sospecha clínica de cáncer, pero de ellos 93,2 % tenían antígeno prostático específico en rango dudoso (4,1-10 ng/ml); 49 pacientes (45,3 %) presentaron al examen dígito-rectal sospecha clínica de cáncer de próstata, de ellos el 77,6 % con antígeno prostático por encima de 20 ng/ml; 48 pacientes representando el 44,4 % del estudio con positividad de cáncer prostático. Debe señalarse que todos estos casos tuvieron un Gleason alto; el 81,3 % (39 pacientes) y tenían una fase metastásica de la enfermedad. **Conclusiones:** la detección del cáncer de próstata desde el Primer Nivel de Atención de Salud en fase avanzada de la enfermedad tributa a un retardado diagnóstico.

Palabras clave: cáncer de próstata, atención primaria de salud y antígeno prostático específico