

Revista Cubana de Urología

UROLOGÍA PEDIÁTRICA

Quiste parauretral femenino. Presentación de 4 casos. Revisión de la literatura.

Autores: Carmen Bárbara Mora Casaco; Dania Madiedo Pérez.

Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez. La Habana, Cuba

Correo: bmorac@infomed.sld.cu

RESUMEN

Introducción: El quiste parauretral representa menos del 0,5 % de las malformaciones congénitas de las vías urinarias. Se reporta mundialmente una incidencia de 1:2000 a 1:7000 en los nacimientos femeninos. La mayoría de estos quistes disminuyen de tamaño durante las primeras cuatro a ocho semanas, pero pueden presentar síntomas de infección u obstrucción urinaria. **Material y Método:** Fueron diagnosticados y tratados en nuestro hospital durante los últimos 2 años, 4 casos, a los cuales se les realizaron estudios como: microbiología de la orina y ultrasonido abdominal, no se consideró necesario la uretrocistografía como otros autores preconizan. **Resultados:** A los casos en su totalidad se les realizó exéresis del quiste obteniendo la desaparición de los síntomas por los cuales acudieron a consulta. **Conclusiones:** Consideramos que la conducta frente a esta entidad es sin dudas la exéresis del quiste ya que los resultados son muy buenos y se obtiene la satisfacción del paciente.

Palabras clave: uretra, quistes.